



Smittsom klauvsjuke - fotråte hos sau

Forfatter
Synnøve Vatn, Animalia

Sammendrag
Fotråte hos sau er en smittsom infeksjonssjukdom i klauv og klauvspalte. Sjukdommen skyldes bakterien *Dichelobacter nodosus* i samspill med bakterien *Fusobacterium necrophorum*. Her kan du lese mer om hvordan en kan stille diagnosen.

Publisert
2008

Referanse
Sau og Geit nr. 4/2008

Utskriftsdato
31.07.2021 www.fag.nsg.no

Smittsom klauvsjuka - fotråte hos sau



Fakta om sjukdommen

Fotråte hos sau er en smittsom infeksjons-
sjukdom i klauv og klauvspalte.

Sjukdommen skyldes bakterien
Dichelobacter nodosus i samspill
med bakterien *Fusobacterium
necrophorum*

- *Dichelobacter nodosus* finnes kun i smittede besetninger. Bakterien overlever i klauvene hos smittede dyr, også hos dyr som ikke har symptomer
- *Fusobacterium necrophorum* finnes "over alt" i jord og møkk

Et fuktig og urent miljø disponerer for
sjukdommen.

I tilfellene som hittil er oppdaget i
Norge har symptomene først og fremst
forekommet høst, vinter og vår.

Fotråte fører til alvorlige skader i
klauvene, halthet og redusert
dyrevelferd.

Halthet og smerter fører også til
redusert føropptak og nedsatt
produksjon.

Der fotråte får etablere seg medfører
sjukdommen økt arbeidsinnsats
og kostnader for å holde sjukdommen
i sjakk.



Fotråte er smertefullt. Det er vanlig å se dyr som står på framknærne for å avlaste klauvene.

Når skal man mistenke fotråte?

- Halthet på flere dyr i flokken
- Halthet på flere bein (ikke alltid – kan være vanskelig å se)
- Forandringer i begge/flere klauver (ikke alltid)
- Forandringer i klauvspalten som minner om fotråte
- Forandringer i klauvene som minner om fotråte: akutte (eks. løsning av såle/klauvvegg) eller kroniske (eks. unormal klauvfasong)
- Alle punktene må ikke være til stede for at man skal mistenke fotråte
- Det kan være store variasjoner i symptomer fra dyr til dyr
- Alvorlighetsgraden og antall sjuke dyr kan variere mye fra besetning til besetning
- Symptomene kan også variere mellom årstider, avhengig av miljøforhold m.m.

Fakta om fotråte :

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles på grunnlag av:

- Kliniske symptomer
- Prøvetaking og påvisning av *Dichelobacter nodosus*

Påvisning av bakterien krever spesialundersøkelser:

- Laboratoriet skal derfor kontaktes på forhånd!



Prøver tas fra ferske forandringer i huden i klauvspalten.



Fotråte begynner vanligvis med en betennelse i huden i klauvspalten. Huden blir gjerne fuktig, rødlig og hårløs. Ofte kan man også se et lyst belegg i klauvspalten. Det kan i mange tilfeller også kjennes en karakteristisk vond lukt.

Infeksjonen kan spre seg videre inn under klauvkapselen, og klauvkapselen kan løsne i større eller mindre grad. Løsningen begynner på innsiden av klauven, inn mot klauvspalten.



Betennelse i klauvspalten og under klauvkapselen.



Skade og løsning av hornvevet i sålen på begge klauvene. Normalt skal klauvene ha en glatt og jevn overflate.



Begynnende løsning av klauvkapselen.



Løsningen kan fortsette under sålen og etter hvert også langs ytterveggen. I alvorlige tilfeller kan hele klauvkapselen løsne og falle av.

Infeksjonen fører til at veksten av hornet i klauven forstyrres. Klauvene kan da etter hvert få en unormal fasong. En del dyr forblir kronisk infiserte med *Dichelobacter nodosus*. Hos disse dyra kan bakterien overleve i klauvene i årevis. Slike dyr er en viktig smittekilde.



Klauven til høyre på bildet har en unormalt kort og butt fasong p.g.a. forstyrrelser i hornveksten.

Tiltak mot sjukdommen

Tiltak mot fotråte må skje på flokknivå, man blir ikke kvitt sjukdommen bare gjennom behandling av enkelt dyr.

Tiltakene består av en kombinasjon av:

- Fotbad med sinksulfat
- Antibiotikabehandling
- Utslaktning av kronisk infiserte dyr

Tiltakene bør bare gjennomføres i forbindelse med påvist smitte og/eller som ledd i en systematisk bekjempelse av sjukdommen i samråd med praktiserende veterinær og Mattilsynet.



Systematisk undersøkelse av alle klauver som ledd i bekjempelse av fotråte.



Fotbad med sinksulfat.



Alle besøkende bør bruke besetningens eget fottøy og overtrekkstøy eller engangsovertrekk.

Hvordan beskytte flokken mot fotråte?

Generelt: Reduser kontakt med andre flokker så mye som mulig

Innkjøp av sau fra smittede besetninger utgjør den største risikoen for å få smitten inn i besetningen.

Tett kontakt med dyr fra smittede besetninger, for eksempel i værringer, på transport, i samlekvær o.l., medfører også en betydelig smitterisiko.

Smitten kan også overføres mellom besetninger med skittent fottøy og utstyr.

Geit og storfe kan også ha infeksjoner med *D. nodosus* i klauvene. Andre arter kan være passive bærere av smitten.



Blanding av dyr fra flere flokker utgjør en smitterisiko.



Spesielt i forbindelse med fellesbeite og transport:

- Ikke opprett nye smittekontakter /beitekontakt med nye flokker
- Dyr som slippes i felles beiteområder slippes flokkvis
- Unngå felles transport av dyr fra ulike flokker
- Hvis samme transportmiddel benyttes til flere flokker bør det som minimum skiftes strø mellom hver flokk
- Vask og desinfiser transportmidler mellom transport av flokker fra ulike beitelag
- Unngå "opphoping" av dyr fra flere flokker på små arealer under sanking og skilling
- Dersom saltstein brukes bør disse plasseres på fjell/steingrunn. Bruk mange steiner for å unngå stor dyretetthet
- Dyr med halthet eller forandringer i klauvene skal ikke slippes på fellesbeite.



Fotråte hos sau er en meldepliktig sykdom, ved mistanke om fotråte skal praktiserende veterinær eller Mattilsynet - tlf 06040 - kontaktes !