



# Holdvurdering av mjølkegeiter

Forfatter

Helga Kvamsås, Topp Team Fôring Geit  
Hege Gonsholt, Topp Team Fôring Geit

Sammendrag

Holdvurdering er eit godt hjelpemiddel til å vurdere fettreservene til geita og bør alltid vere ein del av grunnlaget for korleis ein førar geitene i siste del av laktasjonen og i tørrperioden.

Publisert

2013

Referanse

Sau og Geit nr.4/2013

Utskriftsdato

23.04.2024 [www.fag.nsg.no](http://www.fag.nsg.no)


# Holdvurdering av mjølkegeiter

**Holdvurdering er eit godt hjelpe-middel til å vurdere fettreservene til geita og bør alltid vere ein del av grunnlaget for korleis ein førar geitene i siste del av laktasjonen og i tørrperioden.**

Dei ulike produksjonsstadiene hos mjølkegeitene heng nøye sammen. Föring og stell i siste del av laktasjonen og i tørrperioden verkar inn på mjølkeyting og mjølkekvalitet i neste laktasjon. Rett föring og stell i denne perioden har mykje å seie for kvaliteten på råmjølka og livskraft og vekstevne til kjea som vert fødde.

## Tørrperioden vert ofte for kort til å bygge opp godt hold

Det er vanleg at geiter mobiliserer opp til 1 kg av kroppsreservane per veke første månaden i laktasjonen og 0,5 kg per veke i andre månaden. Totalt betyr det ei mobilisering på opp til 6 kg i tidleg laktasjon, avhengig av mjølkeyting og förstyrke. Desse kroppsreservane skal byggast opp att, og unge geiter skal også ha dekkja



næringsbehovet til tilvekst første og andre året.

Næringsbehovet til fostertilvekst er lågt fram til om lag dag 100 i drektigheitsperioden, men stig raskt dei siste vekene før kjeing. Samstundes går föropptaket ned fordi fosterata tek stadig større plass. Geiter med to eller fleire foster har sjeldan moglegheit til å bygge opp hold siste månaden før kjeing. Dersom geitene er i dårlig hold ved avsining, vil en tørrperiode på 8 veker bli for knapp til å bygge opp feittreservar. Planlegging av oppbygging av holdet på dyra må derfor starte i god til før avsining.

## Holdvurdér geitene **2½** månad før avsining

Er tørrperioden 8 veker, og geitene tynne, må ein planlegge föringa slik at en del av holdoppbygginga kan skje dei siste månadane av laktasjonen.

Det er ikkje mogleg å vurdere holdet hos geitene berre ved å sjå på dei. Det er heilt naudsynt å kjenne på dyra og vurdere feittlaget. Med litt øving går det raskt å sette holdpoeng - kanskje 0-15 sekund per geit.

Holdpoeng vert sett etter ein skala frå 1 til 5, der 1 er ei sjukleg tynn geit og 5 er overfeitt.

Kilde: *Body Condition Scores in Goats (2004)*. Vilaquiran M., m.fl. Tilgjengelig fra [http://www.luresext.edu/goats/research/BCS\\_factsheet.pdf](http://www.luresext.edu/goats/research/BCS_factsheet.pdf)

Topp Team Föring Geit TINE  
Helga Kvamsås  
Hege Gonsolt

## 2 ½ månad før avsining:

- Holdvurdér alle geiter
- Ta grovförprøver
- Planlegg disponering av grovfôret
- Grupper geitene etter hold
- Planlegg föringa i siste del av laktasjonen og tørrperioden
- Legg ein plan for avsining

Hjelp til planlegging får du hos TINE Rådgiving

## Innredning for sau, geit og storfe Strekkmetall



**Korgen Mek  
Verksted AS**

8646 Korgen

Tlf.: 75 19 11 90

Mob.: 47 32 26 65

Fax: 75 19 11 90

E-post: post@korgenmek.no

**SPINNVILT**

rokker, spinneutstyr,  
kardemaskiner, kammer m.m.  
SPINNEKURS.

**www.spinnvilt.no**



## Holdpoeng 1

Veldig tynn

Ryggakkar:  
lik tenner  
i eit sagblad.



Tverrutvokstrar:  
lett å gripe under,  
halve lengda er  
synlig.




**Brystbeinet:** ingen  
feittlag, det er lett å  
kjenne sjølv  
brystbeinet.



## Holdpoeng 2

Tynn

Ryggakkar:  
individuelle bein  
kan sjåast, men litt  
avrunda.



Tverrutvokstrar:  
kan gripe under  
med fingertuppane,  
ca. ¼ del av lengda  
er synleg.



**Brystbeinet:** eit lite  
feittlag kan gripast  
mellan tommel og  
peikefinger,  
bevegast lett frå  
side til side.




## Holdpoeng 3

Middels til godt  
hold

**Anbefalt hold  
ved kjeing er 3,5**

Ryggakkar:  
ein kan sjå individuelle  
bein, men takkane er  
mjuke og avrunda  
(holdpoeng: 3,5).



Tverrutvokstrar:  
mjuke med tydelig  
feittlag. Først ved  
hardt trykk  
er det mogleg  
å få fingrane



**Brystbeinet:** har godt  
feittlag. Kan gripast  
rundt med tommel  
og pekefinger, men  
vanskeleg å bevege frå  
side til side.



## Holdpoeng 4-5

Feit

Ryggakkar:  
dekt med feitt, ryg-  
graden kjennes flat.



Tverrutvokstrar:  
kanten er knapt  
synleg, dekt av feitt.  
Ikkje mogleg å  
trykkje fingrane  
under.



**Brystbeinet:** feittlag  
som er vanskeleg å  
gripe rundt. Kan  
ikkje bevegast frå  
side til side.