



Holdvurdering av mjølkegeiter

Forfatter

Helga Kvamsås, Topp Team Fôring Geit

Hege Gonsholt, Topp Team Fôring Geit

Sammendrag

Holdvurdering er eit godt hjelpemiddel til å vurdere fettreservene til geita og bør alltid vere ein del av grunnlaget for korleis ein fôrar geitene i siste del av laktasjonen og i tørtperioden.

Publisert

2013

Referanse

Sau og Geit nr.4/2013

Utskriftsdato

31.07.2021 www.fag.nsg.no


Holdvurdering av mjølkegeiter

Holdvurdering er eit godt hjelpemiddel til å vurdere fettreservene til geita og bør alltid vere ein del av grunnlaget for korleis ein fôrar geitene i siste del av laktasjonen og i tørrperioden.

Dei ulike produksjonsstadiene hos mjølkegeitene heng nøye saman. Fôring og stell i siste del av laktasjonen og i tørrperioden verkar inn på mjølkeyting og mjølkekvantitet i neste laktasjon. Rett fôring og stell i denne perioden har mykje å seie for kvaliteten på råmjølka og livskraft og vekstevne til kjea som vert fødde.

Tørrperioden vert ofte for kort til å bygge opp godt hold

Det er vanleg at geiter mobiliserer opp til 1 kg av kroppsreservane per veke første månaden i laktasjonen og 0,5 kg per veke i andre månaden. Totalt betyr det ei mobilisering på opp til 6 kg i tidleg laktasjon, avhengig av mjølkeyting og fôrstyrke. Desse kroppsreservane skal byggast opp att, og unge geiter skal også ha dekk



næringsbehovet til tilvekst første og andre året.

Næringsbehovet til fostertilvekst er lågt fram til om lag dag 100 i drektighetsperioden, men stig raskt dei siste vekene før kjeing. Samstundes går fôropptaket ned fordi fosteret tek stadig større plass. Geiter med to eller fleire foster har sjeldan moglegheit til å bygge opp hold siste månaden før kjeing. Dersom geitene er i dårleg hold ved avsingning, vil ein tørrperiode på 8 veker bli for knapp til å bygge opp fettreservar. Planlegging av oppbygging av holdet på dyra må derfor starte i god tid før avsingning.

Det er ikkje mogleg å vurdere holdet hos geitene berre ved å sjå på dei. Det er heilt naudsynt å kjenne på dyra og vurdere feittlaget. Med litt øving går det raskt å sette holdpoeng - kanskje 0-15 sekund per geit.

Holdpoeng vert sett etter ein skala frå 1 til 5, der 1 er ei sjukleg tynn geit og 5 er overfeit.

Kilde: *Body Condition Scores in Goats* (2004). Viaquiran M., m.fl. Tilgjengelig fra http://www.luresext.edu/goats/research/BCS_factsheet.pdf

Topp Team Fôring Geit TINE
Helga Kvamsås
Hege Gonsholt

Innredning for sau, geit og storfe Strekkmessing



Korgen Mek Verksted AS

8646 Korgen

Tlf.: 75 19 11 90

Mob.: 47 32 26 65

Fax: 75 19 11 90

E-post: post@korgenmek.no

Holdvurdér geitene 2½ månad før avsingning

Er tørrperioden 8 veker, og geitene tynne, må ein planlegge fôringa slik at en del av holdoppbygginga kan skje dei siste månadane av laktasjonen.

SPINNVILT

rokker, spinneutstyr,
kardemaskiner, kammer m.m.
SPINNEKURS.

www.spinnvilt.no

2 ½ måned før avsingning:

- Holdvurdér alle geiter
- Ta grovfôrprøver
- Planlegg disponering av grovfôret
- Grupper geitene etter hold
- Planlegg fôringa i siste del av laktasjonen og tørrperioden
- Legg ein plan for avsingning

Hjelp til planlegging får du hos TINE Rådgiving



Holdpoeng 1 Veldig tynn

Ryggtakkar:
lik tenner
i eit sagblad.



Tverrutvokstrar:
lett å gripe under,
halve lengda er
synlig.




Brystbeinet: ingen
feittlag, det er lett å
kjenne sjøve
brystbeinet.



Holdpoeng 2 Tynn

Ryggtakkar:
individuelle bein
kan sjåast, men litt
avrunda.



Tverrutvokstrar:
kan gripe under
med fingertuppane,
ca. ¼ del av lengda
er synleg.




Brystbeinet: eit lite
feittlag kan gripast
mellom tommel og
peikefinger,
bevegast lett frå
side til side.



Holdpoeng 3 Middels til godt hold

**Anbefalt hold
ved kjeing er 3,5**

Ryggtakkar:
ein kan sjå individuelle
bein, men takkane er
mjuke og avrunda
(holdpoeng: 3,5).



Tverrutvokstrar:
mjuke med tydelig
feittlag. Først ved
hardt trykk
er det mogleg
å få fingrane
under.




Brystbeinet: har godt
feittlag. Kan gripast
rundt med tommel
og pekefinger, men
vanskeleg å bevege frå
side til side.



Holdpoeng 4-5 Feit

Ryggtakkar:
dekt med feitt, ryg-
graden kjennes flat.



Tverrutvokstrar:
kanten er knapt
synleg, dekt av feitt.
Ikkje mogleg å
trykkje fingrane
under.



Brystbeinet: feittlag
som er vanskeleg å
gripe rundt. Kan
ikkje bevegast frå
side til side.