



# Smittevern ved sanking og transport

Forfatter

Lisbeth Hektoen, Animalia

Sammendrag

Den tida dyra går på utmarksbeite er det i de fleste tilfeller ikke noe stort smittepress, men i forbindelse med sanking og hjemtransport er det potensiale for smittespredning. Alle bør derfor tenke gjennom hvilke tiltak de kan gjennomføre for å beskytte egen og andres flokk.

Publisert

2011

Referanse

Sau og Geit nr. 4/2011

Utskriftsdato

24.10.2021 [www.fag.nsg.no](http://www.fag.nsg.no)

# Smittevern ved sanking og transport

*I disse dager er mange sauer på vei hjem fra fellesbeite. Selve beiteperioden medfører i de fleste tilfeller ikke noe stort smittepress, men i forbindelse med sanking og hjemtransport er det potensiale for smittespredning. Alle bør derfor tenke gjennom hvilke tiltak de kan gjennomføre for å beskytte egen og andres flokk.*

Smittsom øyebetennelse, (resistente) parasitter, byllesjuka, fotråte, paratuberkulose og mædi er noen av de sykdommene som kan spres gjennom tett kontakt i ei sankekve eller på en bil. Alle disse sykdommene finnes i Norge, selv om flere av dem sjelden påvises. Sykdommene smitter på ulike måter, og noen smitter lettere enn andre. Det viktigste tiltaket mot spredning av alle disse sykdommene er uansett å redusere kontakten mellom dyr fra forskjellige besetninger mest mulig og å gjøre kontakt, som ikke kan unngås, så kortvarig som mulig.

Det kan gjennomføres mange ulike tiltak som vil redusere smittefare i forbindelse med sanking. Det er ofte praktisk vanskelig å gjennomføre alt, men noe er absolutt bedre enn ingenting!

- Sank flokken for seg når det er mulig.
- Se etter halte og sjuke dyr, undersøk dem og fjern dem helst fra resten av flokken. Å ivareta hensynet til de sjuke dyras velferd er også en viktig del av dette.
- Underlaget i felles sanke- og skillekveer må være så tørt som mulig - tenk på plassering og drenering. Tette skillevegger mellom kveene er en fordel.
- Kortest mulig opphold i sanke-/skillekveer der flere flokker samles.



*Felles sanking utgjør en risiko for spredning av smittsomme sykdommer, men mange tiltak kan gjøres for å redusere den. (Foto: Grethe Ringdal)*

- Unngå så langt som mulig hjemtransport sammen med andre flokker.
- Mellom transport av dyr fra ulike flokker bør transportmiddelet kosteres og det bør has på reint, tørt strø. Dersom samme bil er brukt til transport av dyr fra andre sanke-

områder, må vask og desinfeksjon foretas først.

*Av Lisbeth Hektoen  
Helsetjenesten for sau*

## Fra NSG sin Handlingsplan for smittevern i saueholdet:

### Transport fra sanking hjem til gård:

- Om mulig, kun én besetning per transport

### Sanking/skilling:

- Tiden fra sanking til skilling bør være kortest mulig
- Lav dyretetthet gir mindre smittepress
- Godt drenerende underlag, og

helst tette skillevegger mellom sankekveer

- I store drifter bør det, om mulig, legges inn en karenndag mellom hver sankedag.

